

orgitan[®] care

VOEDINGSSUPPLEMENT MET ZOETSTOFFEN, MET LEVENDE MELKZUURBACTERIËN

NOTIFICATIENUMMER PL/NUT/AS 553/106

ORGITAN[®] CARE is geschikt om op verschillende niveaus in de darm te koloniseren, dankzij de complementaire werking van 5 levende melkzuurbacteriënstammen. Via de gepatenteerde technologie zijn de levende melkzuurbacteriën van ORGITAN[®] CARE van een dubbele coating voorzien. De eerste laag houdt de levende melkzuurbacteriën in goede conditie. De tweede laag beschermt de levende melkzuurbacteriën tegen maagsap en gal. Door dit pH-afhankelijke coatingsysteem blijven de levende melkzuurbacteriën in goede conditie en in leven.

PRESENTATIE

15 kauwtabletten, CNK 3319-514

30 kauwtabletten, CNK 3319-506

90 kauwtabletten, CNK 3319-522

GEBRUIKSAANWIJZING

ORGITAN[®] CARE moet oraal ingenomen worden.

De tabletten kunnen gekauwd of doorgeslikt worden en hebben een ananasmaak.

1 kauwtablet per dag of volgens deskundig advies. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden. Voedingssupplementen kunnen geen gevarieerde en evenwichtige voeding vervangen, noch een gezonde levensstijl. Vraag raad aan uw arts en/of apotheker.

ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING

ORGITAN[®] CARE kan tijdens de zwangerschap en borstvoeding worden gebruikt.

INTERACTIES MET VOEDING

Er zijn geen interacties gekend met andere voedingsmiddelen.

BIJWERKINGEN

ORGITAN[®] CARE wordt in het algemeen zéér goed verdragen. Bij langdurig gebruik werden geen bijwerkingen aangetoond.

BEINVLOEDING VAN DE RIJVAARDIGHEID EN HET VERMOGEN OM MACHINES TE BEDIENEN

ORGITAN[®] CARE heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

HOUDBAARHEID

Zoals vermeld op de verpakking. De houdbaarheidsdatum verwijst naar het ongeopend product, correct bewaard.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de originele verpakking en bij voorkeur niet boven de 25°C. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren.

INGREDIËNTEN

1 tablet

Levende melkzuurbacteriën	2,3 x 10 ⁹ CFU
S. thermophilus	5,0 x 10 ⁸ CFU
B. longum	3,8 x 10 ⁸ CFU
L. acidophilus	5,4 x 10 ⁸ CFU
L. rhamnosus	3,8 x 10 ⁸ CFU
B. lactis	4,6 x 10 ⁸ CFU


L: Lactobacillus

B: Bifidobacterium

S: Streptococcus

Hulpstoffen

Fructo-oligosaccharides (FOS); Vulstoffen: Microkristallijne Cellulose, Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Zoetstoffen: Isomalt, Sucrose; Antiklontermiddel: Magnesiumstearaat; Aroma: Ananas; Antioxidant: Ascorbinezuur.



orgitan® care

COMPLEMENT ALIMENTAIRE AVEC EDULCORANTS, AVEC BACTERIES LACTIQUES VIVANTES

NUMERO DE NOTIFICATION PL/NUT/AS 553/106

ORGITAN® CARE est adapté pour coloniser à différents niveaux dans l'intestin, par l'action complémentaire de 5 souches de bactéries lactiques vivantes. Les bactéries lactiques vivantes contenus dans ORGITAN® CARE sont conditionnés grâce à une technologie brevetée de double enrobage. La première couche conserve les bactéries lactiques vivantes. La deuxième couche protège les bactéries lactiques vivantes du suc gastrique et de la bile. Grâce à ce système de protection, nous garantissons la libération pH-dépendant et la survie des bactéries lactiques vivantes.

PRESENTATION

15 comprimés à croquer, CNK 3319-514

30 comprimés à croquer, CNK 3319-506

90 comprimés à croquer, CNK 3319-522

POSOLOGIE

Les comprimés doivent être pris par voie orale.

Les comprimés peuvent être mâchés ou avalés et ont le goût d'ananas.

1 comprimé à croquer par jour ou selon les recommandations. Ne pas excéder l'apport journalier recommandé. Les compléments alimentaires ne peuvent pas se substituer à un régime alimentaire varié et équilibré, ni à un mode de vie sain. Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

ORGITAN® CARE peut être consommé pendant la grossesse et pendant l'allaitement.

INTERACTION AVEC L'ALIMENTATION

Il n'y a aucune interaction connue avec les aliments.

EFFETS SECONDAIRES EVENTUELS

En général, ORGITAN® CARE est très bien supporté. En cas d'usage à long terme, aucun effet secondaire n'a été constaté.

INFLUENCE SUR LA CONDUITE D'UN VEHICULE ET L'UTILISATION DE MACHINES

ORGITAN® CARE n'a pas d'influence sur la conduite d'un véhicule ou l'utilisation de machines.

CONSERVATION

Voir date sur l'emballage. La date d'expiration fait référence au produit non ouvert et correctement conservé.

PRECAUTIONS PARTICULIERES

DE CONSERVATION

Conserver au sec dans l'emballage d'origine, de préférence à une température inférieure à 25°C. Conserver hors de la portée de jeunes enfants.

INGRÉDIENTS

1 comprimé

Bactéries lactiques vivantes	2,3 x 10 ⁹ CFU
S. thermophilus	5,0 x 10 ⁸ CFU
B. longum	3,8 x 10 ⁸ CFU
L. acidophilus	5,4 x 10 ⁸ CFU
L. rhamnosus	3,8 x 10 ⁸ CFU
B. lactis	4,6 x 10 ⁸ CFU

L: Lactobacillus

B: Bifidobacterium

S: Streptococcus

Excipients:

Fructo-oligosaccharides (FOS); Agents de charge:

Cellulose Microcristalline, Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC); Edulcorant: Isomalt, Sucre; Antiagglomérant:

Stéarate de magnésium; Arôme: Ananas; Antioxydant:

Acide ascorbique